

# + 清创缝合术

---



## 【适应征】

开放性损伤:

- 1.伤后6-8h以内的；
- 2.伤口污染较轻,不超过伤后12h；
- 3.头面部伤后24h内可行清创术。

## 【禁忌征】

化脓、感染伤口不宜缝合。

## 【会诊指征】

1. 合并颅脑、胸、腹有严重损伤；
2. 深部贯通伤者；
3. 四肢开放性骨折者；
4. 合并有肌腱断裂、重要血管、神经损伤者；

# 【准备工作】

- 1.器械准备：

消毒钳、持针器、镊子（有齿及无齿镊）、缝合线、剪刀、引流条或橡皮膜、双氧水、外用生理盐水、纱布、棉垫、绷带、胶布、75%乙醇、碘伏等。

- 2.手术者洗手，戴手套。

## 【操作方法】

- 清洗去污：

①用无菌纱布覆盖伤口；

②剪去毛发，除去伤口周围的污垢油腻（用肥皂水、松节油），用外用生理盐水清洗创口周围皮肤。

# 【操作方法】

伤口的处理：

- ①常规麻醉后，消毒伤口周围的皮肤，取掉覆盖伤口的纱布，铺无菌巾。换手套，穿无菌手术衣；
- ②检查伤口，清除血凝块和异物；
- ③切除失去活力的组织；
- ④必要时可扩大伤口，以便处理深部创伤组织；
- ⑤伤口内彻底止血；
- ⑥最后再次用无菌生理盐水和双氧水反复冲洗伤口。

# 【操作方法】

缝合伤口：

- ①更换手术单、器械和手术者手套；
- ②按组织层次缝合创缘；注意进针、出针、缝线走形、缝合深度、缝合张力适当、针距边距适当等。(根据不同的组织情况决定针距1cm、边距0.5cm的大小，并做到均匀一致)
- ③污染严重或留有死腔时应置引流物或延期缝合皮肤。

## 【操作方法】

伤口覆盖无菌纱布或棉垫，以胶布固定。

## 【术后处理】

注意伤肢血运，合理应用抗生素,注射TAT；

在术后24～48小时拔除伤口引流条或引流管；

伤口出血或感染时，拆除缝线，检查原因，进行处理；

# 执业医师资格考试实践技能考试

## 考试项目 时间 分值一览表

| 考站  | 考试项目      |     | 分值<br>(分) |    | 考试时间<br>(分钟) |    |
|-----|-----------|-----|-----------|----|--------------|----|
| 第一站 | 病史采集      |     | 15        | 37 | 11           | 26 |
|     | 病例分析      |     | 22        |    | 15           |    |
| 第二站 | 体格检查      |     | 20        | 40 | 13           | 24 |
|     | 基本操作技能    |     | 20        |    | 11           |    |
| 第三站 | 心肺听诊      | 试题1 | 4         | 23 | 15           |    |
|     |           | 试题2 | 4         |    |              |    |
|     | 影像(X线、CT) | 试题1 | 2         |    |              |    |
|     |           | 试题2 | 2         |    |              |    |
|     |           | 试题3 | 2         |    |              |    |
|     | 心电图       | 试题1 | 3         |    |              |    |
|     |           | 试题2 | 4         |    |              |    |
|     | 医德医风      |     | 2         |    |              |    |
| 合计  |           |     | 100       |    | 65           |    |



# 清创缝合术操作标准(外科).xls



谢谢